

➤ **پایان یافته:**

- (۱) بررسی تأثیر میزان قند خون بر نتایج کاشت دریچه آئورت ترانس کاتتر (TAVI) در بیماران بدون دیابت و دیابتیک: یک مطالعه مرور سیستماتیک
- (۲) ارزش پیش آگهی افزایش ترانس آمیناز و نسبت ترانس آمیناز (AST/ALT) در انفارکتوس حاد میوکارد: یک مرور سیستماتیک
- (۳) بررسی ارتباط ابتلا به هایپوتیروئیدی با آسیب سیستم ادراری در خانم های مبتلا به دیابت از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ شهر اصفهان
- (۴) بررسی پیامد های زودرس و دیررس تعبیه دریچه آئورت با کاتتر (TAVI) در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان چمران در سال ۱۴۰۲
- (۵) بررسی شیوع و تعیین عوامل خطر اکتازی عروق کرونر (با و بدون تنگی عروق کرونر همراه) در بیماران تحت آنژیوگرافی قرار گرفته در بیمارستان قلب چمران اصفهان طی ۵ سال گذشته (۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰)
- (۶) بررسی مقایسه ای عوارض عروقی مرتبط با خارج سازی شیت شریانی با به کارگیری دستگاه کلمپیس و فشار دست در بیماران تحت آنژیوگرافی بستری در بخش Post Angiography بیمارستان فوق تخصصی شهید چمران اصفهان سال ۱۴۰۰
- (۷) بررسی نتایج بالینی کوتاه مدت درمان بیماران بالغ نیازمند درمان ASD Device Closure مراجعه کننده به مرکز قلب و عروق شهید چمران اصفهان در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ تا پایان ۱۴۰۰
- (۸) بررسی فراوانی و هزینه اقدامات تشخیصی و درمانی تهاجمی بیماری های قلبی عروقی در بیمارستان های منتخب شهر اصفهان در سال-های ۱۳۹۸-۱۳۹۹
- (۹) بررسی ارتباط میانگین دوز دریافتی قلب در پرتودرمانی سرطان پستان چپ با مقادیر PRO-BNP و TROPONIN و عملکرد سیستمی بطن چپ بر اساس مقادیر LVEF و GLS در اکوکاردیوگرافی
- (۱۰) بررسی شیوع دیاستولیک دیسفانکشن بطن چپ در بیماران کریپتوژنیک استروک مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا در سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹
- (۱۱) بررسی شدت و الگوی درگیری آنژیوگرافیک عروق کرونر در زنان مبتلا به بیماری عروق کرونر از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ در بیماران تحت آنژیوگرافی در شهرهای اصفهان، اهواز، بندرعباس و بیرجند.
- (۱۲) بررسی و پیگیری عواقب بالینی کوتاه و طولانی مدت بیماران دارای انوریسم آئورت شکمی تحت مداخله اندوواسکولار در شهر اصفهان
- (۱۳) بررسی و پیگیری یکساله بروز حوادث قلبی و غیر قلبی بیماران تحت آنژیوپلاستی ثبت شده در سامانه ثبت بیماری های قلبی و عروقی کشوری
- (۱۴) ارزیابی روایی روش های اندازه گیری غیر مستقیم فشارخون شریانی در مقایسه با فشارخون مستقیم داخل آئورت در افراد تحت آنژیوگرافی عروق کرونر
- (۱۵) بررسی مرگ و میر داخل بیمارستانی و ۶ ماه بعد از انفارکتوس حاد میوکارد با صعود قطعه ST (STEMI) و عوامل موثر بر آن در بیماران مبتلا به COVID-19 در شهر اصفهان در بازه زمانی آغاز پاندمی تا کنون
- (۱۶) مطالعه سیستماتیک مروری و متاآنالیز در رابطه با تاثیر جنسیت در درمان مونو تراپی با مهارکننده های P2Y12 بر حوادث قلبی و عروقی و عوارض خونریزی در بیماران تحت آنژیوپلاستی با استنت های دارویی

۱۷) بررسی ارزش پیشگویی کنندگی نسبت کلسیم اسکور به تعداد نقاط کلسیفیه هم در تعیین دیاگنوستیک بودن یا نبودن سی تی آنژیوگرافی و هم در تعیین شدت بیماری عروق کرونر

۱۸) بررسی صحت و ضمانت کیفیت ورود اطلاعات در سامانه ثبت اطلاعات آنژیوگرافی- آنژیوپلاستی

۱۹) تعیین اثر طراحی و اجرای فرآیند کنترل کیفیت داده های سامانه ثبت اطلاعات (DATA REGISTRY) آنژیوگرافی- آنژیوپلاستی عروق کرونر کشور بر شاخص های تمامیت، ثبات، جامعیت و دوستدار کاربر بودن سامانه

۲۰) تعیین پیامد داخل بیمارستانی تعبیه بالون پمپ داخل آنورت در بیماران داخلی قلب از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ در بیمارستان قلب شهید چمران اصفهان

۲۱) بررسی میزان بروز ۲ ساله عوارض قلبی عروقی و آسیب ارگان های حیاتی در بیماران مبتلا به پرفشاری خون تحت درمان در درمانگاه پرفشاری خون پژوهشکده چمران از سال ۱۳۹۷-۱۳۹۹

۲۲) بررسی پیامد کوتاه مدت بیماران جوان مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد و فاکتورهای موثر بر آن

۲۳) بررسی عوامل خطر مرتبط با سبک زندگی در مبتلایان به بیماری عروق کرونر زودرس در قومیت های مختلف در ایران در قیاس با افراد سالم و مقایسه در بین قومیت های مختلف (پایان نامه پزشک پژوهشگر)

۲۴) بررسی مقایسه ای فراوانی عوارض ناشی از ترومبوآمبولی ریوی با ریسک بالا پس از عملکرد سریع تیم مسئول آمبولی ریوی (تیمار) نسبت به عملکرد CONVENTIONAL در سال ۹۸ در مراکز آموزشی درمانی قلبی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۲۵) بررسی دانش و عملکرد پزشکان عمومی استان اصفهان درمورد مدیریت و درمان پرفشاری خون و تاثیر آموزش گایدلاین بر آن

۲۶) نشان دادن میزان قابلیت انجام و ایمنی آنژیوگرافی از راه شریان اولنار در بیمارانی که شریان رادیال همان سمت در دسترس نباشد

۲۷) بررسی سابقه فامیلی پدري و مادري مثبت پرفشاری خون در افراد با بیماری پرفشاری خون و افراد پره هایپرنتشن و افراد نرمال

۲۸) مقایسه دو روش آنژیوگرافی عروق کرونر از طریق فضای انفیه دان تشریحی و از طریق شریان رادیال از نظر میزان ایمنی و سهولت

۲۹) بررسی فراوانی یافته های اسکن پرفیوژن میوکارد (MPS) برحسب نتیجه ی آنژیوگرافی در بیماران دچار ایسکمی متوسط در بیمارستان چمران و عسگریه ی شهر اصفهان در سال ۱۳۹۷

۳۰) بررسی میزان بروز حوادث قلبی- عروقی در بیماران مبتلا به درگیری تنه اصلی کرونر چپ با یا بدون درگیری ۳ رگ کرونر تحت آنژیوپلاستی یا جراحی قلب باز یا درمان دارویی یا بدون درمان مراجعه کننده به بخش آنژیوپلاستی بیمارستان چمران و عسگریه اصفهان با استفاده از یک مطالعه ی Historical Cohort (Data Based Registry)

۳۱) بررسی ارتباط بین میزان آلاینده های هوا دارای قطر کمتر از ۲/۵ میکرومتر (PM2.5) بامیانگین فشار خون در اولین روز مراجعه در بیماران بستری در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ۱۳۹۰

۳۲) بررسی تأثیر یک مداخله چند وجهی بر کنترل فشارخون و تبعیت دارویی بیماران با پرفشاری خون کنترل نشده مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ۱۳۹۷

۳۳) بررسی مقایسه ای یافته های الکتروکاردیوگرام در بیماران مبتلا به صرع لوب تمپورال مقاوم به درمان با گروه کنترل در مراجعین به کلینیک جامع صرع بیمارستان آیت اله کاشانی در سال ۱۳۹۶

۳۴) بررسی آناتومی قوس های شریانی کف دست و تعیین محل پانکچر شاخه ها بر اساس لندمارک استخوانی در آنژیوگرافی انتخابی شریال های رادیال و اولنار

- ۳۵) بررسی تغییرات سطح سرمی تروپونین I و T قبل و بعد از همودیالیز در بیماران کلیوی شهر اصفهان با عملکرد بطن چپ بالای ۵۰
- ۳۶) بررسی تنوع دارویی و تبعیت دارویی و ارتباط آن با کنترل فشار خون در بیماران مبتلا به پرفشاری خون در شهر اصفهان سال ۱۳۹۴
- ۳۷) مقایسه دو روش آنژیوگرافی عروق کرونر از طریق شریان پالمار سطحی و شریان اولنار از نظر میزان ایمنی و سهولت
- ۳۸) مقایسه نتایج داپلر شریان کلیوی در دو گروه با و بدون ابتلا به نفروپاتی پس از تزریق کنتراست برای آنژیوگرافی
- ۳۹) مقایسه دو روش هموستاز از طریق فشار موضعی با دست و استفاده از مچ بند اولنار در آنژیوگرافی به روش دسترسی شریان PALMAR سطحی کف دست
- ۴۰) مقایسه دو روش هموستاز از طریق فشار موضعی با دست و استفاده از مچ بند رادیال در آنژیوگرافی به روش SNUFF BOX
- ۴۱) بررسی اختلال عملکرد اندوتلیوم lone atrial fibrillation
- ۴۲) بررسی میزان بروز بیماریهای قلبی و عروقی در بیماران دچار آپنه انسدادی خواب (پلی سومنوگرافی مثبت) از ابتدای سال ۹۲ لغایت انتهای شهریور ۹۶ در بیماران مراجعه کننده به کلینیک بامداد اصفهان
- ۴۳) تعیین میزان بروز CVA, MI و مرگ و میر در خوشه های حاوی دیابت، خوشه های حاوی فشارخون بالا و خوشه های متشکل از هر دو در مبتلایان به سندروم متابولیک از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۵ در شهر اصفهان
- ۴۴) بررسی پیامدهای استنت گذاری کاروتید در بیماران مراجعه کننده به مراکز قلب و عروق اصفهان
- ۴۵) بررسی و مقایسه فراوانی نسبی حوادث قلبی عروقی داخل بیمارستانی در دو روش Primary PCI با و بدون استفاده ابتدایی از کاتتر ترومبوساکشن Export در بیماران مبتلا به سکته قلبی حاد با Total Cut Off در بیمارستان چمران، اصفهان، سال ۱۳۹۴
- ۴۶) مقایسه ی عوارض و نتایج بیماران تحت PCI با استنت های قابل جذب و دارویی از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴ در بیمارستان های شهرستان اصفهان در پیگیری یک ساله
- ۴۷) بررسی روند عوامل موثر بر شیوع، آگاهی، کنترل و درمان پرفشاری خون در میان بالغین شهر اصفهان (در طی ۱۵ سال) و ارزیابی تاثیر مدل توسعه یافته مراقبت مزمن بر کنترل و درمان بیماری و خودمراقبتی (پایان نامه Phd by research)
- ۴۸) بررسی عوارض هموستاز باز (Patent Hemostasis) در روش ترانس رادیال آنژیوگرافی در مقایسه با هموستاز کلاسیک
- ۴۹) بررسی تاثیر تله نرسینگ بر شاخص توده بدنی و فشارخون در افراد با پره هایپرنتشن ترخیص شده از اورژانس منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱۳۹۵
- ۵۰) کاربرد مدل Age-Period-Cohort در برآورد و پیش بینی بروز و شیوع ایسکمی قلبی براساس جنس، سن و محل سکونت در اصفهان در دوره زمانی ۸۸ تا ۹۸
- ۵۱) ارتباط بین نسبت سدیم به پتاسیم ادرار ۲۴ ساعته با شاخص های چاقی در کودکان و نوجوانان ۱۱ تا ۱۸ سال شهر اصفهان در سال ۱۳۹۴
- ۵۲) بررسی ارتباط بین میزان پیروی از رژیم غذایی DASH در سطوح مختلف سدیم دریافتی با شاخص های چاقی در کودکان و نوجوانان ۱۱-۱۸ سال شهر اصفهان
- ۵۳) بررسی تاثیر و مقایسه ی دو روش خودپایشی و تله نرسینگ بر میزان فشارخون مبتلایان به پرفشاری خون مراجعه کننده به مرکز تحقیقات پرفشاری خون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ۱۳۹۴

- ۵۴) بررسی تأثیر مدل مراقبت پیگیر بر اصلاح سبک زندگی و تغییرات فشارخون بیماران مبتلا به پرفشاری خون مراجعه کننده به مرکز پرفشاری خون اصفهان در سال ۱۳۹۴
- ۵۵) بررسی تأثیر یک برنامه آموزشی اصلاح سبک زندگی بر میزان دانش، نگرش و عملکرد مبتلایان به پرفشاری خون تحت آنژیوپلاستی مراجعه کننده به بیمارستان شهید چمران اصفهان در سال ۱۳۹۳
- ۵۶) بررسی تأثیر برنامه حمایتی همتایان بر پایبندی به رژیم درمانی و تغییرات فشار خون در بیماران مبتلا به پرفشاری خون مراجعه کننده به مرکز تحقیقات پرفشاری خون اصفهان در سال ۱۳۹۴
- ۵۷) ارزیابی ضایعات عروق کرونر با شدت متوسط در آنژیوگرافی معمولی با تعیین کسر جریان خون ضایعه
- ۵۸) بررسی ارتباط فنوتیپهای مختلف سندرم متابولیک با بروز حوادث قلبی
- ۵۹) بررسی اپیدمیولوژیک روند بروز و میزان کشندگی ناشی از سکنه‌های مغزی در شهرستان اصفهان ۱۳۸۰-۱۳۹۲
- ۶۰) تعیین تأثیر طولانی مدت قطع عصب سمپاتیک کلیوی و عوارض ناشی از آن بر بیماران مبتلا به فشارخون مقاوم به درمان مراجعه کننده به بیمارستان چمران در سال ۱۳۹۱-۱۳۹۲
- ۶۱) بررسی ارتباط سابقه فامیلی فشارخون و چگونگی و اندازه حساسیت فشارخون به نمک در افراد با فشارخون نرمال
- ۶۲) بررسی و مقایسه عوامل موثر بر عدم کنترل فشارخون در بیماران مبتلا به فشارخون بالا در مطالعه کوهورت ۲۰۰۱ و ۲۰۰۷ اصفهان
- ۶۳) ارزیابی روایی و پایایی پرسشنامه بسامد خوراک برای ارزیابی دریافت سدیم، سهم گروههای غذایی در دریافت آن و ارتباط با سطح فشارخون در دو گروه سنی بزرگسالان و کودکان و نوجوانان یک جامعه ایرانی
- ۶۴) طراحی و اجرای برنامه مداخله ای مبتنی بر نیاز مراقبین خانوادگی بیماران مبتلا به نارسایی قلب: یک مطالعه ترکیبی
- ۶۵) بررسی فاکتورهای موثر بر عوارض اصلی بدنبال آنژیوپلاستی در بیماران با انفارکتوس قلبی در طول مدت بستری
- ۶۶) BMI یا میکرو آلبومینوری، کدام یک در پیش بینی و پیشگیری اختلال دیاستولی قلب در بیماران فشار خونی غیردیابتیک از اهمیت بیشتری برخوردار است
- ۶۷) مقایسه حوادث عمده قلبی MACE در آنژیوپلاستی عروق کرونری با استنتهای دارویی در مقابل استنتهای غیر دارویی در پیگیری یکساله در مطالعه OPCES
- ۶۸) بررسی رخدادهای زودرس و دیررس پس از آنژیوپلاستی عروق کرونر در بیماران مراجعه کننده به مرکز پزشکی شهید چمران اصفهان در یک دوره ۶ ماهه
- ۶۹) توزیع فراوانی پلی مورفیسم P450 2C19*2 در بیماران مبتلا به بیماری ایسکمیک قلبی دارای استنت کرونر در اصفهان
- ۷۰) بررسی فراوانی عوارض کوتاه مدت (MACE) بعد از انجام Percutaneous Coronary Intervention در بیماران با انفارکتوس حاد میوکارد مراجعه کننده به بیمارستان چمران اصفهان در طی شش ماه
- ۷۱) بررسی تأثیر عوامل خطر ژنتیکی ترومبوفیلیک بر ایجاد ترومبوز وریدهای عمقی در بیماران بستری در بیمارستان الزهرا اصفهان
- ۷۲) بررسی رابطه سطح سرمی و عملکرد پاراکساناز عملکرد (HDL) بیماران قلبی و عروقی زیر ۴۰ سال با Significant CAD در مقایسه با افراد بدون Significant CAD

۷۳) بررسی ارتباط نسبت آلبومین به کراتینین ادرار با تغییرات ایسکمیک الکتروکاردیوگرافیک براساس کد مینسوتا در یک نمونه راندوم از جامعه اصفهان

۷۴) بررسی تاثیر زمان خروج از تخت بر میزان عوارض پس از خروج شیت بیماران تحت آنژیوپلاستی کرونری در بخش سی سی یو بیمارستان شهید چمران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ۱۳۸۶

۷۵) بررسی اثر افزودن LOW DOSE IMMEDIATE RELEASE NICOTINIC ACID سیموستاتین در بالا بردن میزان HDL

۷۶) بررسی ارتباط پلاک آترواسکلروتیک عروق کاروتید اکستراکرنیال و میانگین سطح آنتی بادی ضد هلیکوباکتریپیلوری (IgG) در بیماران با استروک ایسکمیک در بخش نورولوژی بیمارستان الزهرا(س)

۷۷) Association between chlamydia pneumonia infection seropositivity and carotid atherosclerotic plaque

۷۸) تجارب بازتوانی در بیماران قلبی

۷۹) بررسی ارتباط سطح $Ip(a)$, CRP, WBC لیپید پروفایل بیماران CAD باری استنوز پس از PTCA

۸۰) بررسی ارتباط نمره سندرم متابولیک شدت و وسعت درگیری عروق کرونر در آنژیوگرافی در بیماران مبتلا به آنژین صدری

۸۱) بررسی اثر متورال بر ریسک سی روزه قلبی عروقی در بیماران با ریسک متوسط و زیاد قلبی تحت عمل جراحی غیر قلبی

۸۲) مقایسه تأثیر درمانی آتنولول ساخت شرکت داروپخش ایران و خارجی در بیماران با پرفشاری خون

۸۳) بررسی میزان آگاهی های نظری و مهارت سنجی عملی در کادر پرستاری، کارورزان و دستیاران مشغول به فعالیتهای مختلف بیمارستان الزهرا (س)، در مورد عملیات احیای قلبی- ریوی در تابستان ۱۳۸۲